

PREVENCIÓN ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA EN PACIENTE QUIRÚRGICO

Nombre Paciente: _____ Edad: _____ R.U.T: _____

Tipo de Cirugía: _____ Fecha de Evaluación: _____

Unidad de Aplicación: _____ Hora de Evaluación: _____

(Selecciona solo el factor de riesgo clínico de mayor puntuación)

A FACTORES DE RIESGO CLÍNICO	1 PUNTO	2 PUNTOS	3 PUNTOS	5 PUNTOS
	<input type="radio"/> Cirugía Menor	<input type="radio"/> Cirugía mayor	<input type="radio"/> Cirugía mayor con infarto al miocardio	<input type="radio"/> Artroplastia mayor electiva de EEII
		<input type="radio"/> Paciente confinado a cama (mayor a 72 hrs)	<input type="radio"/> Cirugía mayor con falla congestiva del corazón (< 1 mes)	<input type="radio"/> Fractura de cadera, pelvis o pierna
		<input type="radio"/> Inmovilización con yeso	<input type="radio"/> Cirugía mayor en paciente séptico	<input type="radio"/> Tromboembolismo
		<input type="radio"/> Acceso venoso central		<input type="radio"/> Politraumatizado
		<input type="radio"/> Cirugía artroscópica		<input type="radio"/> Lesión aguda de médula espinal (parálisis) < 1 mes
PUNTAJE OBTENIDO				

(Seleccionar uno o más, debiendo sumar todos los puntajes de los factores seleccionados)

B FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL PACIENTE	1 PUNTO	2 PUNTOS	3 PUNTOS
	<input type="radio"/> Edad 41 a 60 años	<input type="radio"/> Edad > 60 años	<input type="radio"/> Historia de TVP o TEP
	<input type="radio"/> IMC ≥ 30 Kg/m2	<input type="radio"/> Enfermedad neoplásica	<input type="radio"/> Trombofilia
	<input type="radio"/> Várices	<input type="radio"/> Enfermedad reumatológica	<input type="radio"/> Familiar directo con ETV
	<input type="radio"/> Embarazo o puerperio		
	<input type="radio"/> Anticoncepción hormonal		
	<input type="radio"/> Historia de abortos espontáneos inexplicados o recurrentes		
	<input type="radio"/> Sepsis (<1 mes)		
	<input type="radio"/> Enfermedad pulmonar grave incluida neumonía (<1 mes)		
	<input type="radio"/> Infarto agudo de miocardio		
<input type="radio"/> Insuficiencia cardiaca congestiva (<1 mes)			
<input type="radio"/> Enfermedad inflamatoria intestinal			
<input type="radio"/> Paciente inmovilizado por enfermedad médica			
PUNTAJE OBTENIDO			

(Para puntaje final, sumar puntajes obtenidos A y B, aplicar profilaxis (C), según puntaje final.

C PROFILAXIS	IGUAL O MENOR A 1	IGUAL A 2	ENTRE 3 Y 4	IGUAL O SUPERIOR A 5
	<input type="radio"/> Sin medidas específicas	<input type="radio"/> Medias de compresión graduada o HBPM	<input type="radio"/> Medias de compresión graduada o HBPM	<input type="radio"/> Medias de compresión graduada o HBPM
	<input type="radio"/> Deambulación precoz		<input type="radio"/> Compresión neumática intermitente intra cirugía (opción ideal)	<input type="radio"/> Compresión neumática intermitente intracirugía obligatoria
				<input type="radio"/> Considerar interconsulta vascular según opción del tratante
PUNTAJE OBTENIDO				

RESPONSABLE APLICACIÓN EVALUACIÓN: _____ **FIRMA:** _____

Cirugía menor: Utilización de prácticas quirúrgicas sencillas, duración <30 minutos, se realiza en tejidos superficiales y/o accesibles y que precisando, en general, anestesia local, tienen riesgo y complicaciones postquirúrgicas escasas.