

## EXÁMENES GINECOLÓGICOS Y GENITOURINARIOS (I-023)

### Estimado/a paciente:

Su médico le ha indicado un examen que requiere la toma de muestra de flujo vaginal o secreción uretral. Este análisis busca detectar la presencia de agentes infecciosos en el. Los resultados le permitirán a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.

El examen requiere de una muestra de buena calidad, por lo que debe leer las siguientes instrucciones hasta el final antes de concurrir a la toma de muestra.

### Requisitos:

- Para este examen **NO debe estar en su periodo menstrual.**
- Debe tener un periodo de **abstinencia sexual de 2 días como mínimo** previo al examen.
- Durante los 2 días previos a la toma de muestra no utilice talcos, cremas, colonias, óvulos vaginales, ni realice duchas vaginales.
- Idealmente tomar la muestra con retención urinaria y sin aseo matutino.
- No haberse realizado una ecografía transvaginal 48 horas previas al examen
- Antes de concurrir a la Unidad de Toma de Muestras, **idealmente sin aseo.**
- Evite el uso de bicarbonatos o vinagre en su aseo genital, use solo agua.
- Si su médico le indico el examen Mycoplasma/Ureaplasma, Secreción uretral o Cultivo de Gonococo uretral (masculino), la muestra debe ser tomada mínimo 3 horas después de orinar.
- En caso que el médico le haya indicado muestra de orina Primer Chorro debe:
  - ❖ Contar con retención mínima de 3 a 4 horas.
  - ❖ Abra el frasco y orine los primero 20 cc (aproximadamente).
  - ❖ Termine de orinar en la taza del baño.
  - ❖ Cierre herméticamente el frasco para evitar filtración.
- En niñas menores, pacientes sin actividad sexual y/o con cultivo de Streptococcus Vagino Rectal no realizar aseo genital externo.
- Idealmente el examen se debe tomar sin terapia de antibióticos, o los debe haber dejado como mínimo hace 3 días. De todos modos realizar el examen fuera de estos criterios queda a decisión de su médico tratante.

### Recolección de la(s) muestra(s):

- Será realizada en la Unidad de Toma de Muestras.

### Traslado de la muestra:

- No aplica.

**NOTA:** Si usted está embarazada y presenta síntomas de parto prematuro (contracciones), la muestra debe ser tomada por su médico o matrona tratante.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal de la Unidad de Toma de Muestras o llámenos al fono 55-2468152 - 55-2468100